

## Formulaire à compléter et à présenter à votre médecin ou dans un centre de prélèvement



Colox est indiqué pour les femmes et les hommes à partir de 50 ans qui ne présentent pas de symptômes gastro-intestinaux.

La coloscopie (et non Colox) est indiquée pour les personnes présentant un risque de cancer du côlon plus élevé que la moyenne, en raison de :

- Un antécédent personnel de polypes adénomateux ou de cancer du côlon
- Un antécédent familial de premier degré de cancer du côlon
- Un antécédent familial et/ou personnel de syndrome héréditaire à haut risque tel que Syndrome de Lynch (HNPCC), polypose adénomateuse familiale (PAF), etc.
- Un antécédent personnel de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), maladie de crohn, rectocolite hémorragique (RCH), etc.

Afin d'éviter de possibles réactions croisées, Colox n'est pas indiqué chez les personnes ayant :

- Une maladie inflammatoire en phase aiguë
- Un cancer, actuellement ou lors des 5 dernières années
- Une infection aiguë, actuellement ou lors des 4 dernières années
- Subi un traumatisme physique important ou médical (chirurgie) lors des 6 derniers mois
- Reçu une transfusion de sang lors des 4 dernières semaines.

Nom: .....

Prénom: .....

Sexe: .....

Age: .....

Nom du médecin traitant:  
.....

- J'accepte que le laboratoire informe mon médecin traitant
- Je refuse que le laboratoire informe mon médecin traitant

Date: .....

Signature:  
.....

